

Fluturele mărul lupului *Zerynthia polyxena*



© Maximilian Teodorescu

Cândva relativ frecvent în preajma pâlcurilor de *Aristolochia* (mărul-lupului, cucurbețică) din zonele umede sau chiar de la marginea culturilor sau zonelor locuite, acest fluturele mărului lupului a fost tot mai puternic afectat în a doua jumătate a secolului XX de folosirea ierbicidelor și de extinderea agriculturii intensive. În ultimele două decenii, populațiile locale ale acestui fluture au reușit să supraviețuiască mai ales în preajma terenurilor agricole abandonate, la lizierele umede sau chiar pe marginea drumurilor și căilor ferate, acolo unde au continuat să existe pâlcuri din ce în ce mai firave de mărul lupului. Pentru a putea continua să admirăm zborul direct și vesel al acestui fluture în a doua jumătate a primăverii, sunt necesare măsuri urgente de protejare a habitatului său natural tot mai fragmentat și mai restrâns, eliminarea poluării chimice, stoparea extinderii turismului dezorganizat și restrângerea aridizării produse de încălzirea climatei. (Dr. Mihai Stănescu, Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa)



© Maximilian Teodorescu



Material informativ realizat de
Societatea Lepidopterologică
Română, www.lepidoptera.ro
Design: Andrei Crișan